

病名： 乳癌

レジメン名： フェスゴIN+パクリタキセル(初回用)

1コース期間(休薬期間含む) 21 日

薬剤名/ルート・用法	基準投与量	割合	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21
			火 day1 未適用	水	木	金 day2~day7 休薬	土	日	月	火 day8 未適用	水	木	金 day9~day14 休薬	土	日	月	火 day15 未適用	水	木	金 day16~day21 休薬	土	日	月
注射																							
カロナール錠200mg	2錠																						
内服【のみぐすり】	00:01		未適用																				
●<初回投与>フェスゴIN配合皮下注	1 V/BODY	100																					
皮下注射ケモ CSTD	00:05		未適用																				
生食注シリンジ 10mL	1 シリンジ																						
皮下注射ケモ	00:06		未適用																				
生理食塩液【化カ】50mL	1 V																						
ファモチジン注射液 20mg	1 A																						
デキサート注射液6.5mg 2mL	1 V																						
ポラミン注 5mg 1mL	2 A																						
末梢点滴ケモ(持続)加算A	00:10		未適用																				
ブドウ糖注 5% 250mL	1 V																						
●パクリタキセル注30mg	80 mg/m ²	100																					
末梢点滴ケモ CSTD(側管)	00:15		未適用																				
生理食塩液【化カ】50mL	1 V																						
末梢点滴ケモ(持続)加算A	00:16		未適用																				
生理食塩液【化カ】50mL	1 V																						
ファモチジン注射液 20mg	1 A																						
デキサート注★3.3mg 1mL	1 A																						
ポラミン注 5mg 1mL	2 A																						
末梢点滴ケモ(持続)	00:05									未適用													
ブドウ糖注 5% 250mL	1 V																						
●パクリタキセル注30mg	80 mg/m ²	100																					
末梢点滴ケモ CSTD(側管)	00:10									未適用													
生理食塩液【化カ】50mL	1 V																						
末梢点滴ケモ(持続)	00:15									未適用													
生理食塩液【化カ】50mL	1 V																						
ファモチジン注射液 20mg	1 A																						
デキサート注☆1.65mg 0.5mL	1 A																						
ポラミン注 5mg 1mL	2 A																						
末梢点滴ケモ(持続)	00:05																				未適用		
ブドウ糖注 5% 250mL	1 V																						
●パクリタキセル注30mg	80 mg/m ²	100																					
末梢点滴ケモ CSTD(側管)	00:10																				未適用		
生理食塩液【化カ】50mL	1 V																						
末梢点滴ケモ(持続)	00:15																				未適用		