病名：卵巣癌　　レジメン名：Doce-CBDCA

1コース期間（休薬期間含む）　　21　日

薬剤名／ルート・用法	基準投与量	割合	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
			day1	day2～day21																			
			未適用	休薬																			
注射																							
ソリューゲンF注 500mL	1 V																						
末梢点滴ケモ（持続）加算A	00:10		未適用																				
グラニセトロン注 3mg100mL	1 V																						
デキサート注射液6.6mg 2mL	2 V																						
アロカリス点滴静注235mg10mL	1 V																						
末梢点滴ケモ（持続）	00:15		未適用																				
生理食塩液注 500mL(ﾃﾙﾊﾟｯｸ)	1 V																						
●ドセタキセル注 ☆20mg	60 mg/m²	100																					
末梢点滴ケモ CSTD（側管）	00:20		未適用																				
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																						
末梢点滴ケモ（持続）	00:25		未適用																				
生理食塩液注 500mL(ﾃﾙﾊﾟｯｸ)	1 V																						
●カルボプラチン注 60mg 5mL	5 mg/GFR+25	100																					
末梢点滴ケモ CSTD（側管）	00:30		未適用																				
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																						
末梢点滴ケモ（持続）	00:35		未適用																				