病名：卵巣癌　　レジメン名：Doxil−CBDCA

1コース期間（休薬期間含む）　28　日

薬剤名／ルート・用法	基準投与量	割合	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
			day1	day2～day28																										
			未適用	休薬																										
注射																														
グラニセトロン注 3mg100mL	1 V																													
デキサート注射液6.6mg 2mL	2 V																													
デキサート注 ★3.3mg 1mL	1 A																													
アロカリス点滴静注235mg10mL	1 V																													
末梢点滴ケモ(持続)	00:10		未適用																											
ブドウ糖注 5% 250mL	1 V																													
● パクシル注 30mg 10mL	30 mg/㎡	100																												
末梢点滴ケモ CSTD(側管)	00:15		未適用																											
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																													
末梢点滴ケモ(持続)	00:20		未適用																											
生理食塩液注 500mL(テルパック)	1 V																													
● カルボプラチン注 50mg 5mL	5 mg/GFR+25	100																												
末梢点滴ケモ CSTD(側管)	00:25		未適用																											
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																													
末梢点滴ケモ(持続)	00:30		未適用																											