病名：卵巣癌　　レジメン名：GEM卵巣癌

1コース期間（休薬期間含む）　28　日

薬剤名／ルート・用法	基準投与量	割合	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
			day1	day2～day7						day8	day9～day14					
			未適用	休薬						未適用	休薬					
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V															
デキサート注射液6.6mg 2mL	1 V															
末梢点滴ケモ（持続）	00:05		未適用							未適用						
生理食塩液「ヒカリ」100mL	1 V															
●ゲムシタビン点滴静注 200mg	1000 mg/㎡	100														
末梢点滴ケモ CSTD（側管）	00:10		未適用							未適用						
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V															
末梢点滴ケモ（持続）	00:15		未適用							未適用						

薬剤名／ルート・用法	基準投与量	割合	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
			day15						day16～day28							
			未適用						休薬							
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V															
デキサート注射液6.6mg 2mL	1 V															
末梢点滴ケモ（持続）	00:05		未適用													
生理食塩液「ヒカリ」100mL	1 V															
●ゲムシタビン点滴静注 200mg	1000 mg/㎡	100														
末梢点滴ケモ CSTD（側管）	00:10		未適用													
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V															
末梢点滴ケモ（持続）	00:15		未適用													