

病名:子宮頸癌

レジメン名:CCRT(TC)

1コース期間(休薬期間含む) 35 日

| 薬剤名/ルート・用法 | 基準投与量 | 割合 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 |
|---------------------|----------------------|-----|------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|-----|------------------|-----|------|-----------------------|------|------|------|-------------------|------|------|------------------------|------|------|------|
| | | | 火 day1 未適用 | 水 | 木 | 金 day2~day7 休薬 | 土 | 日 | 月 | 火 day8 未適用 | 水 | 木 | 金 day9~day14 休薬 | 土 | 日 | 月 | 火 day15 未適用 | 水 | 木 | 金 day16~day21 休薬 | 土 | 日 | 月 |
| 注射 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| グラニセトロン注 3mg 100mL | 1 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アロカリス点滴静注235mg 10mL | 1 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デキサート注射液6.5mg 2mL | 1 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ボラミン注 5mg 1mL | 2 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フアモキシド注 20mg | 1 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 末梢点滴ケモ(持続) | 00:20 | | 未適用 | | | | | | | 未適用 | | | | | | | 未適用 | | | | | | |
| ブドウ糖注 5% 250mL | 1 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ●パクリタキセル注30mg | 35 mg/m ² | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 末梢点滴ケモ CSTD(側管) | 00:25 | | 未適用 | | | | | | | 未適用 | | | | | | | 未適用 | | | | | | |
| 生理食塩液[比力]50mL | 1 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 末梢点滴ケモ(持続) | 00:30 | | 未適用 | | | | | | | 未適用 | | | | | | | 未適用 | | | | | | |
| ブドウ糖注 5% 250mL | 1 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ●カルボプラチン注 50mg 5mL | 2 mg/GFR+25 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 末梢点滴ケモ CSTD(側管) | 00:35 | | 未適用 | | | | | | | 未適用 | | | | | | | 未適用 | | | | | | |
| 生理食塩液[比力]50mL | 1 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 末梢点滴ケモ(持続) | 00:40 | | 未適用 | | | | | | | 未適用 | | | | | | | 未適用 | | | | | | |

| 薬剤名/ルート・用法 | 基準投与量 | 割合 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 |
|---------------------|----------------------|-----|-------------------|------|------|------------------------|------|------|------|-------------------|------|------|------------------------|-----|-----|-----|
| | | | 火 day22 未適用 | 水 | 木 | 金 day23~day28 休薬 | 土 | 日 | 月 | 火 day29 未適用 | 水 | 木 | 金 day30~day35 休薬 | 土 | 日 | 月 |
| 注射 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| グラニセトロン注 3mg 100mL | 1 V | | | | | | | | | | | | | | | |
| アロカリス点滴静注235mg 10mL | 1 V | | | | | | | | | | | | | | | |
| デキサート注射液6.5mg 2mL | 1 V | | | | | | | | | | | | | | | |
| ボラミン注 5mg 1mL | 2 A | | | | | | | | | | | | | | | |
| フアモキシド注 20mg | 1 A | | | | | | | | | | | | | | | |
| 末梢点滴ケモ(持続) | 00:20 | | 未適用 | | | | | | | 未適用 | | | | | | |
| ブドウ糖注 5% 250mL | 1 V | | | | | | | | | | | | | | | |
| ●パクリタキセル注30mg | 35 mg/m ² | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 末梢点滴ケモ CSTD(側管) | 00:25 | | 未適用 | | | | | | | 未適用 | | | | | | |
| 生理食塩液[比力]50mL | 1 V | | | | | | | | | | | | | | | |
| 末梢点滴ケモ(持続) | 00:30 | | 未適用 | | | | | | | 未適用 | | | | | | |
| ブドウ糖注 5% 250mL | 1 V | | | | | | | | | | | | | | | |
| ●カルボプラチン注 50mg 5mL | 2 mg/GFR+25 | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 末梢点滴ケモ CSTD(側管) | 00:35 | | 未適用 | | | | | | | 未適用 | | | | | | |
| 生理食塩液[比力]50mL | 1 V | | | | | | | | | | | | | | | |
| 末梢点滴ケモ(持続) | 00:40 | | 未適用 | | | | | | | 未適用 | | | | | | |