

病名：悪性神経膠腫

レジメン名： ベバシズマブBS+内服TMZ併用療法（外来）

1 コース期間（休薬期間含む）

28 日

薬剤名/ルート・用法	基準投与量	割合	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
			day1 未適用						day2~day4 休業							day1 5 未適用							day1 6~day28 休業							
注射																														
生理食塩液「ヒカ」50mL	1 V																													
末梢点滴ケモ(持続)	00:05		未適用																											
生理食塩液「ヒカ」100mL	1 V																													
ベバシズマブBS点滴静注 100mg/4mL	10 mg/kg	100																												
末梢点滴ケモ(持続)	00:10		未適用																											
生理食塩液「ヒカ」50mL	1 V																													
末梢点滴ケモ(持続)	00:15		未適用																											
生理食塩液「ヒカ」50mL	1 V																													
末梢点滴ケモ(持続)	00:05																未適用													
生理食塩液「ヒカ」100mL	1 V																													
ベバシズマブBS点滴静注 100mg/4mL	10 mg/kg	100																												
末梢点滴ケモ(持続)	00:10																未適用													
生理食塩液「ヒカ」50mL	1 V																													
末梢点滴ケモ(持続)	00:15																未適用													
処方																														

注意コメント

day1~5 ナゼアO. 1mgをテモダール内服1時間前に内服。(15時) day 1~5 テモダールは食事の前後2時間以上あけて内服。(16時) テモダール(初回150mg/m²、2回目以降200mg/m²)