病名： 大腸癌　　レジメン名： mFOLFOX6

1コース期間（休薬期間含む）　14　日

薬剤名／ルート・用法	基準投与量	割合	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
			day1	day2～day14												
			未適用	休薬												
注射																
パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg 50ml	1 袋															
デキサート注 ★3.3mg 1mL	1 A															
アロカリス点滴静注235mg10mL	1 V															
中心静脈注射★	00:10		未適用													
ブドウ糖注 5% 250mL	1 V															
●オキサリプラチン注 ☆50mg	85 mg/m²	100														
中心静脈ケモ CSTD（側管）	00:15		未適用													
ブドウ糖注 5% 250mL	1 V															
●レボホリナート注☆ 25mg	200 mg/m²	100														
中心静脈注射★	00:20		未適用													
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V															
●フルオロウラシル注 ☆250mg	400 mg/m²	100														
中心静脈ケモ CSTD（側管）	00:25		未適用													
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V															
中心静脈注射★	00:30		未適用													
生理食塩液注 500mL（テルバック）	1 V															
ノボヘパリン注5000単位5mL	1 V															
●フルオロウラシル注 ☆250mg	2400 mg/m²	100														
中心静脈ケモ CSTD（インフューザーポンプ使用	00:35		未適用													