

病名: 大腸癌

レジメン名: IRIS+ベバシズマブ(4週毎)

1コース期間(休薬期間含む) 28 日

薬剤名/ルート・用法	基準投与量	割合	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
注射																
パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg 50ml	1袋		day2~day14													
デキサート注 ★3.3mg 1mL	1A		day1													
アロカリス点滴静注235mg10mL	1V		未適用													
末梢点滴ケモ(持続)加算A	00:10		未適用													
生理食塩液「ヒカリ」100mL	1V															
●パンスマブES点滴静注 ☆100mg 4mL	5 mg/kg	100														
末梢点滴ケモ(持続)	00:15		未適用													
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1V															
末梢点滴ケモ(持続)	00:20		未適用													
生理食塩液注 500mL(テルパック)	1V															
●イリテカン塩酸塩注 40mg 2mL	100 mg/m <sup>2</sup>	100														
末梢点滴ケモ CSTD(側管)	00:25		未適用													
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1V															
末梢点滴ケモ(持続)	00:30		未適用													
パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg 50ml	1袋															
デキサート注 ★3.3mg 1mL	1A															

注意コメント  
 day1(夕)~15(朝) S-1 80mg~120mg/日  
 day2-4,16-18テカドロン4mg朝

薬剤名/ルート・用法	基準投与量	割合	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
注射			day16~day28													
末梢点滴ケモ(持続)			day15													
末梢点滴ケモ(持続)			未適用													
パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg 50ml	1袋															
デキサート注 ★3.3mg 1mL	1A															
アロカリス点滴静注235mg10mL	1V															
末梢点滴ケモ(持続)加算A	00:10		未適用													
生理食塩液「ヒカリ」100mL	1V															
●パンスマブES点滴静注 ☆100mg 4mL	5 mg/kg	100														
末梢点滴ケモ(持続)	00:15		未適用													
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1V															
末梢点滴ケモ(持続)	00:20		未適用													
生理食塩液注 500mL(テルパック)	1V															
●イリテカン塩酸塩注 40mg 2mL	100 mg/m <sup>2</sup>	100														
末梢点滴ケモ CSTD(側管)	00:25		未適用													
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1V															
末梢点滴ケモ(持続)	00:30		未適用													