

病名: 大腸癌

レジメン名: XELOXIRI

1コース期間(休薬期間含む) 14 日

薬剤名/ルート・用法	基準投与量	割合	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
			day1	day2~day14												
			未適用	休薬												
注射																
パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg 50ml	1 袋															
デキサート注射液6.6mg 2mL	1 V															
デキサート注 ☆1.65mg 0.5mL	1 A															
アロカリス点滴静注235mg10mL	1 V															
末梢点滴ケモ(持続)加算A	00:10		未適用													
生理食塩液注 500mL(テルパック)	1 V															
●イリテカン塩酸塩注 40mg 2mL	150 mg/m ²	100														
末梢点滴ケモ CSTD(側管)	00:15		未適用													
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V															
末梢点滴ケモ(持続)	00:20		未適用													
ブドウ糖注 5%★500mL	1 V															
●オキサリプラチン注 ☆50mg	85 mg/m ²	100														
デキサート注 ☆1.65mg 0.5mL	1 A															
末梢点滴ケモ CSTD(側管)	00:25		未適用													
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V															
末梢点滴ケモ(持続)	00:30		未適用													

注意コメント
 day1(夕)~8(朝)カペシタシン2000mg/m²/day
 day2~5テカドゾル8mg/day