病名: 膵癌 レジメン名: オニバイド+5FU併用療法

1コース期間(休薬期間含む) 14 日

薬剤名/ルート・用法	基準投与量	割合	1/1		1/3		1/5	1/6		1/8	1/9	1/10			1/13	
			火	水	木	金	土	B	月	火	水	木	金	土	B	月
			day1	day2∼day14												
			未適用	·適用 休薬												
注射																
プレトロン点滴静注バッグ 0.75mg 50ml	1袋															
キサート注 ★3.3mg 1mL	1 A															
ロカリス点滴静注235mg10mL	1 V															
中心静脈注射★	00:10		未適用													
ドウ糖注 5%★500mL	1 V															
「必」オニバイド点滴静注43mg10mL	70 mg/m²	100														
中心静脈ケモ CSTD(側管)	00:15		未適用													
:理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V															
中心静脈注射★	00:20		未適用													
ドウ糖注 5% 250mL	1 V															
ルボホリナート注☆ 25mg	200 mg/m²	100														
中心静脈注射★	00:25		未適用													
:理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V															
中心静脈注射★	00:30		未適用													
E理食塩液注 500mL(テルバック)	1 V															
ボヘパリン注5000単位5mL	1 V															
リフルオロウラシル注 ☆250ms	2400 mg/m²	100														
小心静脈ケモ CSTD(インフューザーポンプ使用	00:35		未適用													
処方																
70.77																

注意コメント

day2-4デカドロン4mg