病名：　胆道癌　　レジメン名：　キイトルーダ＋GC療法

1コース期間（休薬期間含む）　　21　日

薬剤名／ルート・用法	基準投与量	割合	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
			day1	day2～day7						day8	day9～day21												
			未適用	休薬						未適用	休薬												
注射																							
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																						
末梢点滴ケモ（持続）加算A	00:00		未適用																				
生理食塩液「ヒカリ」100mL	1 V																						
●キイトルーダ点滴静注★100mg/4mL	200 mg/BODY	100																					
末梢点滴ケモ（持続）加算A	00:05		未適用																				
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																						
末梢点滴ケモ（持続）加算A	00:10		未適用																				
パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg 50ml	1 袋																						
デキサート注 ★3.3mg 1mL	1 A																						
アロカリス点滴静注235mg10mL	1 V																						
末梢点滴ケモ（持続）加算A	00:15		未適用							未適用													
生理食塩液注 500mL（テルパック）	1 V																						
●シスプラチン注 10mg 20mL	25 mg/m²	100																					
末梢点滴ケモ CSTD（側管）	00:20		未適用							未適用													
生理食塩液注 500mL（テルパック）	1 V																						
末梢点滴ケモ（持続）	00:25		未適用							未適用													
生理食塩液「ヒカリ」100mL	1 V																						
●ゲムシタビン点滴静注 200mg	1000 mg/m²	100																					
末梢点滴ケモ CSTD（側管）	00:30		未適用							未適用													
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																						
末梢点滴ケモ（持続）加算A	00:35		未適用							未適用													