病名：MSI high 固形癌　　レジメン名：キイトルーダ療法（400mg/6週毎）

1コース期間（休薬期間含む）　　42　日

薬剤名／ルート・用法	基準投与量	割合	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
			day1																			
			未適用																			
注射																						
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																					
末梢点滴ケモ（持続）	00:05		未適用																			
生理食塩液「ヒカリ」100mL	1 V																					
●キイトルーダ点滴静注液100mg/4mL	400 mg/BODY	100																				
末梢点滴ケモ（持続）	00:10		未適用																			
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																					
末梢点滴ケモ（持続）	00:15		未適用																			
処方																						

1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
	day2～day42																				
	休薬																				