病名:尿路上皮癌・ベリニ管癌 レジメン名:ニボルマブ(4W)療法(12ヶ月)

1コース期間(休薬期間含む) 28 日

薬剤名/ルート・用法	基準投与量	割合	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16
			火	水	木	金	土	\Box	月	火	水	木	金	土	B	月	火	水
			day1													d	lay2 \sim day2	8
			未適用														休薬	
注射																		
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																	
末梢点滴ケモ(持続)	00:05		未適用															
生理食塩液「ヒカリ」 100mL	1 V																	
●オプジーボ点滴静注240mg24ml	480 mg/BODY	100																
末梢点滴ケモ(持続)加算A	00:10		未適用															
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																	
末梢点滴ケモ(持続)	00:15		未適用															
			1 /17	1 /10	1 /10	1 /0	0 1 //	1 1	/00 1	/02	1 /0/1	1 /05	1 /06	1 /07	1 /09			

1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28
木	金	土	B	月	火	水	木	金	土	В	月