

病名: 尿路上皮癌・ペリニ管癌 レジメン名: パドゼブ+キイトルーダ(200mg/3週毎)

1コース期間(休薬期間含む) 21 日

薬剤名/ルート・用法	基準投与量	割合	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
			day1 未適用	day2~day7 休薬						day8 未適用	day9~day21 休薬												
注射																							
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																						
末梢点滴ケモ(持続)加算A	00:01		未適用							未適用													
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																						
デキサート注射液5.6mg 2mL	1 V																						
末梢点滴ケモ(持続)加算A	00:05		未適用							未適用													
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																						
●「パドゼブ」点滴静注30mg	1.25 mg/kg	100																					
注射用水 20mL	1 A																						
末梢点滴ケモCSTD(側管)	00:10		未適用							未適用													
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																						
末梢点滴ケモ(持続)加算A	00:15		未適用							未適用													
生理食塩液「ヒカリ」100mL	1 V																						
●キイトルーダ点滴静注●100mg4m	200 mg/BODY	100																					
末梢点滴ケモ(持続)加算A	00:20		未適用																				
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																						
末梢点滴ケモ(持続)加算A	00:30		未適用																				

注意コメント

入力体重上限100kgまで