病名：腎細胞癌　　レジメン名：キイトルーダ療法（400mg/6週毎）＋インライタ療法

1コース期間（休薬期間含む）　42　日

薬剤名／ルート・用法	基準投与量	割合	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
			day1																					day2～day42	
			未適用																					休薬	
注射																									
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																								
末梢点滴ケモ（持続）	00:05		未適用																						
生理食塩液「ヒカリ」100mL	1 V																								
●キイトルーダ点滴静注液100mg4mL	400 mg/BODY	100																							
末梢点滴ケモ（持続）	00:10		未適用																						
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																								
末梢点滴ケモ（持続）	00:15		未適用																						
処方																									

1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11
木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月

注意コメント

インライタ 5mg×2回/day